



# Алгоритмы оказания первой помощи при неотложных состояниях

## ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

### Признаки:

1. Сильная головная боль.
2. Головокружение.
3. Сердцебиение.
4. В более тяжелых случаях присоединяются:
  - тошнота, рвота;
  - боли в сердце;
  - расстройства зрения;
  - нарушение сознания.



### Первая помощь:

1. Необходимо создать больному полный физический и душевный покой.
2. Помочь измерить артериальное давление (нормальное давление можно считать не выше 140/90 мм рт. ст.).
3. Если у больного имеются лекарственные средства, понижающие давление, дать их немедленно.
4. Отвлечь пострадавшего, поговорить с ним спокойным, доброжелательным тоном.
5. Вызвать скорую помощь, если:
  - эти мероприятия не дали улучшения в течение часа;
  - продолжается подъем давления;
  - появилась боль за грудиной;
  - возникли нарушения речи или потеря сознания.

# НЕ ЖДИ! ЗВОНИ!

# 103



# 112



# Алгоритмы оказания первой помощи при неотложных состояниях

## ИНСУЛЬТ

### Признаки, которые можно распознать со стороны:

1. Попросите **ЗАГОВОРИТЬ**. Не может разборчиво и внятно произнести свое имя.
2. Попросите **УЛЫБНУТЬСЯ**. Уголок рта опущен, улыбка перекошена.
3. Попросите **ПОДНЯТЬ** руки. Не может поднять обе руки, или одна рука ослаблена.
4. Попросите **ВЫСУНУТЬ** язык. Язык искривлен, западает на одну сторону.

### Признаки, которые распознаются самим пострадавшим:



1. Нарушение равновесия.
2. Слабость, онемение в руке или ноге (чаще на одной стороне тела).
3. Нарушение зрения, двоение в глазах.
4. Сильная головная боль.



### Первая помощь.

**ВАЖНО! В течение 3 часов пострадавший должен быть в реанимации!**

#### Помощь до приезда врача:

1. Полный покой в положении лежа. Приподнять верхнюю половину туловища, уложив на подушки.
  2. Обеспечить приток свежего воздуха.
  3. Если больной в сознании, до прихода врача не поить больного.
  4. Если больной без сознания, не трогать его.
- Транспортировать можно только по указанию врача.

# НЕ ЖДИ! ЗВОНИ!

# 103



# 112

## ИНФАРКТ МИОКАРДА

### Признаки:

1. Беспокойное поведение, страх смерти.
2. Больной жалуется на сдавливающую, сжимающую, давящую, жгучую боль справа и слева за грудиной. Чаще боль распространяется в левое и правое плечо, левую руку, в обе лопатки, в шею, нижнюю челюсть. Нередко боль распространяется на подложечную область и сопровождается тошнотой, рвотой.



3. Боль длится более 30 минут, нарастает.
4. Дыхание учащенное, неглубокое. Возможна остановка дыхания.
5. Лицо бледное, покрыто холодным потом.

### Первая помощь:

1. Вызвать скорую помощь при усилении боли за грудиной, длительности боли дольше 20 минут, если после приема нитроглицерина боль не исчезла в течение 5 минут.
2. До приезда врача:
  - Полный физический и психический покой. Уложить, верхнюю часть тела приподнять, подложив подушки.
  - Под язык дать таблетку нитроглицерина до рассасывания, измельченную таблетку аспирина.
  - При тяжелых приступах болей запрещается малейшее напряжение.



# НЕ ЖДИ! ЗВОНИ!

# 103



# 112



ГУЗ «Ульяновский областной  
центр медицинской  
профилактики»

# Алгоритмы оказания первой помощи при неотложных состояниях

## ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ


### Признаки:

1. Потери сознания нет.
2. Дыхание учащенное, неглубокое.
3. Пострадавший жалуется на боль за грудиной сжимающую, давящую, в виде приступов. Она имеет достаточно четкое начало и конец. Боль распространяется в левую половину грудной клетки, левое плечо и руку, в обе лопатки, иногда в шею, нижнюю челюсть.
4. Боль длится не более 10-15 минут.
5. Потливость, слабость.
6. Чувство страха.



### Первая помощь:

1. Если приступ возник во время физической нагрузки, при оказании первой помощи необходимо прекратить ее.
2. Придать положение полусидя, подложить свернутую одежду под плечи и голову, а также под колени.
3. Если пострадавший ранее принимал нитроглицерин, то помочь ему его принять. Для более быстрого эффекта таблетку нужно положить под язык. Если нитроглицерин помог, приступ должен пройти в течение 2-3 минут. Если через несколько минут после приема таблетки боль не прошла - нужно принять ее еще раз.
4. В случае, когда не помогла даже третья таблетка, и боль затянулась на 10-20 минут, нужно немедленно вызывать скорую помощь, чтобы избежать развития инфаркта.



# НЕ ЖДИ! ЗВОНИ!

# 103



# 112